



Vad får drickande under graviditeten för långtidseffekter på barn?

FASD

Fetal Alcohol Spectrum Disorders

alla fysiska, beteendemässiga och kognitiva
effekter som kan bli följderna av
alkoholexponering under
fostertiden

Beteendeproblem och nedsatt kognitiv funktion hos personer med FASD

prefrontal cortex känslig för alkohol: nedsatta exekutiva funktioner

nedsatt förmåga att kontrollera uppmärksamhet och beteende

nedsatt social förmåga

nedsatt intellektuell förmåga

minnessvårigheter och inlärningssvårigheter

hyperaktivitet

koncentrationssvårigheter

nedsatt impulskontroll och svårigheter
att kontrollera aggressivitet

... därför kan barn med FASD ha svårt i skolan

... och efter det?



79 vuxna med FAS-diagnos 18 – 47 år

81% växte upp i familjehem

nu ensamstående, hos föräldrar, några
med familj och barn

13 år i skola – ofta särskola

halva gruppen har arbete

31% förtidspensionerade

ångest, depression

33% psykiatrisk vård

45% sömnmedicin, ångestdämpande

varit mobbade

nedsatta kognitiva, exekutiva funktioner

svårt
planera vardagen

svårt förstå vardagsekonomin

Svårt kontrollera aggressivt beteende





Vad får drickande under graviditeten för långtidseffekter på barn?

– Dåliga!

Förändring i samhället?

Att fler visste vad FAS är

Slippa förklara för läkaren vad FAS är

Att ingen gravid kvinna dricker en enda droppe alkohol



Kvinnor med alkoholberoende
+ psykisk ohälsa

Behöver vård

breda uppsökande och stödjande insatser under graviditet

högspecialiserad för barn, ungdomar och vuxna med FASD

Modell Danmark

– på initiativ av den danska staten väglett av Sundhedsstyrelsen

Regionala tvärprofessionella mottagningar

Arbetar förebyggande och med behandling

Som stöd finns kunskapscentrum i Köpenhamn

